

Szteroidok oxidációs biotranszformációja


Gyógyszerként szteroid hormonokat, származékokat és analógokat alkalmaznak a szervezet szabályozó mechanizmusainak manipulálására.

Az emberi szervezetben működő szteroid hormonoknak szerepe van a:

- > víz- és sóháztartás szabályozásában (mineralokortikoidok)
- > cukorháztartásban (glükoneogenezis) és a gyulladási folyamatok szabályozásában (glükokortikoidok) kortizol = „stresszhormon”
- > nemi működésekben (ösztrogének, gesztagének, androgének)
- > anyagcserében: anabolikus szteroidok

Szteroidok oxidációs biotranszformációja -OH csoport bevétele

A legelső: KRÁMLI & HORVÁTH 1948



Szteroidok biotranszformációja


Természetes szteroidokból indul:

növényi: szitoszterin, dioszgenin, szolaszodin

állati: koleszterin

Több lépésben alakítják ki a kívánt szerkezetet. Ezek között vannak szintetikus és biotranszformációs lépések.

Szerkezet,
 számozás:




-OH csoport bevétele

MURRAY & PETERSEN

UPJOHN Co.

GYULLADÁSGÁTLÓK



Szteroidkonverziók

Az enzimes reakciók előnyei:

- > Enyhe körülmények között végrehajthatók
- > Sztereoszelektív átalakítások lehetségesek
- > Nem szükséges védőcsoportokat rátenni, majd levenni.

Hátránya:


Minden konverziós lépéshez külön enzimet (= törzset) kell keresni. A konverzióhoz használt enzimek szubsztrátja eredetileg nem szteroid, hanem valamilyen más, analóg molekula = régióspecifikus enzimek.

Emiatt a megfelelő mikrobatörzsek keresése (screening) nem tervezhető és nagyon munkaigényes.

A szükséges enzimeket általában nem izolálják, hanem nyugvoéjtes tenyészetben használják.



-OH csoport bevétele

A hidrokortizon klasszikus előállítására Reichstein-S-acetátból történik (direkt 11-hidroxilezés).



Dehidrogénezés


Nem kívánt egyéb hatásai miatt a hidrokortizonból prednizolont állítottak elő, amely szintén gyulladásgátló, de kevesebb a mellékhatása. Az A gyűrű majdnem koplánárrá feszül a 3C-atom miatt. *Arthrobacter/Corynebacterium simplex*.



Szteroidok biotranszformációja

Néhány kereskedelmileg jelentős szteroid átalakítás

REAKCIÓ	SZUBSZTRÁT	TERMÉK	MIKROORGANIZMUS
11 α -hidroxilálás	progesteron	11 α -hidroxi-progesteron	<i>Rhizopus nigricans</i>
11 β -hidroxilálás	Reichstein S	hidrokortizon	<i>Curvularia lunata</i>
16 α -hidroxilálás	9 α -fluoro-kortizol	9 α -fluoro-16 α -hidroxi-kortizol (triamcinolon)	<i>Streptomyces roseochromogenus</i>
1-dehidrogénezés	hidrokortizon	prednizolon	<i>Arthrobacter simplex</i>
	dienediol	trienediol	<i>Septomyxa affinis</i>
1-dehidrogénezés, oldallánc lebontás, D-gyűrű expanzió	progesteron	1-dehidro-tesztololakton (tesztolakton)	<i>Cylindrocarpum radicola</i>
Oldallánc eltávolítás	β -szitoszterin	androsztadién-dion és/vagy androsztén-dion	<i>Mycobacterium sp.</i>



Szteroidok biotranszformációja

Szteroidok mikrobiális transzformációinak reakciótipusai

transzformáció	mechanizmus
oxidáció	szekunder alkohol oxidációja ketonná primer OH csoport bevitele oldalláncra szekunder OH csoport bevitele a szteroid magra terciér OH csoport rávitele a szteroid magra A-gyűrű 1,2 és 4,5 helyzetű dehidrogénezése A-gyűrű aromassá tétele Metilén csoport keto csoportná oxidálása a pregnán oldallánc eltávolítása ketová oxidációval, C17 helyen a pregnán oldallánc eltávolítás C17-nél és D-gyűrű felnyitás tesztololakton képzéssel szteroid oldallánc eltávolítás és karboxil csoportná alakítás pregnán oldallánc (C17) eltávolítása és szekunder alkohollá alakítás epoxid-képzés dekarboxilezés
redukció	keton redukció szekunder alkohollá aldehid redukció primer alkohollá az A-gyűrű 1,2 helyén kettős kötés hidrogénezése az A-gyűrű 4,5 és a B-gyűrű 5,6 kettős kötésének hidrogénezése szekunder alkohol eliminálása
hidrolízis	szteroid észterek szaponifikációja
észterezés	acetilezés

